

Pegasus

Propargite 57% EC

Non-systemic Acaricide With Contact Action

Pegasus

پروپارژیت ۵۷% امولسیون شونده
کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی

Pegasus

Propargite 57% EC

Non-systemic Acaricide With Contact Action

علام مسمومیت: ضعف عضلات، تشنج و بی نظمی در تنفس
کمک های اولیه: در صورت بروز مسمومیت گوارشی تا رسیدن پزشک به مسموم یک لیوان آب داده شود. در صورت آلودگی پوستی لباس را بیرون آورده و قسمت های آلوده را با آب و صابون بشویید. به هنگام مسمومیت تنفسی فرد را به هوای آزاد برده و روی ایشان را بپوشانید. در صورت بروز موارد بیان شده به سرعت به پزشک مراجعه نمایید و این برچسب را به ایشان نشان دهید.

پادزهر: پروپارژیت پادزهر اختصاصی ندارد و درمان بصورت علامتی می باشد.
 راهنمایی برای پزشک: تجویز داروهای آرام بخش مانند دیازپام فنوپاربتال و باربیتورات ها توصیه می گردد.

سمیت برای محیط زیست: پروپارژیت برای ماهی و موجودات آبی مضر است. بنابراین از شستشوی لوازم سمپاشی در نزدیکی منابع طبیعی و آب ها خودداری گردد.

احتیاطات لازم: از خوردن پروپارژیت یا تماس آن با پوست، چشم و لباس خودداری نمایید. در زمان حمل و نقل، سمپاشی و شستشوی وسایل کار از استنشاق ذرات محلول و همچنین از خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن خودداری نمایید. در زمان سمپاشی از لباس کار، کلاه، ماسک، عینک و دستکش استفاده نمایید. در صورت وزش باد ملایم همیشه پشت به باد سمپاشی نمایید. هنگام سمپاشی از پاشیده شدن محلول به مزارع و باغات مجاور خودداری نمایید. در صورت تماس پروپارژیت با دست و صورت، فوراً اقدام به شستشو با آب و صابون نمایید. ظروف و بسته های خالی، در محلی دور از منابع آبی نگهداری شوند و مطابق با ضوابط ملی مربوطه به نسبت به دفع مواد زیست محیطی اقدام گردد.

قابل توجه مصرف کنندگان : مسئولیت خسارت ناشی از عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است، متوجه مصرف کننده می باشد. به دلیل اینکه شرکت آریا شیمی از نحوه مصرف محصولات، شرایط نگهداری، دوز مصرفی، زمان مصرف، شرایط محیطی و اختلاط آن با سایر ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، مسئولیت خسارت ناشی از این موارد را به عهده نمی گیرد.

قابل توجه فروشندگان سموم: ثبت نام و نشانی خریدار و میزان سم فروخته شده با ذکر تاریخ در دفاتر مربوطه توسط فروشنده ضروری است. اجازه ثبت پروپارژیت در ایران در تاریخ ۱۳۵۲/۱۰/۲۷ به تصویب هیات نظارت بر سموم رسیده است.

شرایط حمل و نگهداری: پروپارژیت باید طبق مقررات بین المللی مواد خطرناک حمل و نقل گردد.

پروپارژیت را در جای در بسته خشک، خنک و قفل شده، دور از تابش مستقیم آفتاب و در بسته بندی اصلی با

سم دفع آفات نباتی

دور از دسترس کودکان و در محل قفل شده نگهداری شود.

لطفاً قبل از مصرف پروپارژیت برچسب را با دقت مطالعه فرمایید.

لطفا توجه داشته باشید سمومی که دارای کد مشابه می باشند در تناوب با این کنه کش قرار نگیرند. قبل از مصرف با مشورت کارشناسان حفظ نباتات یا کلینیک های گیاه پزشکی منطقه خود از تاثیر این کنه کش روی آفات مزارع خود اطمینان حاصل فرمایید. از آن جا که تشخیص وجود مقاومت قبل از مصرف آفت کش امکان پذیر نیست، آریا شیمی مسئولیت عدم تاثیر این آفت کش را روی آفات

هدف به دلیل مقاومت های ژنی و اکتسابی نمی پذیرد. به منظور جلوگیری از پدیده مقاومت این سم در تناوب با سایر کنه کش ها استفاده گردد.

ماده موثر: ۵۷۰ گرم بر کیلوگرم
مواد همراه: ۴۳%

نام شیمیایی ماده موثر:

2-(4-tert-butylphenoxy)cyclohexyl prop-2-yne-1-sulfonate

سمیت ماده موثر: Acute Oral LD50 for rat: 2800 mg/kg

گروه خطر: III (احتیاط)
گروه مقاومت براساس IRAC : ۱۲ C



ساخت شرکت آریا شیمی

دفتر مرکزی: پونک، بلوار عدل شمالی، نبش فجر

سوم، پلاک ۱/۱،

تلفن: ۰۲۱)۴۴۴۷۱۰۴۸(

کارخانه: زاهدان، شهرک صنعتی، بلوار تلاش، تلفن:

۰۵۴)۳۳۵۹۲۱۱۲(

معرفی: پروپارژیت کنه کشی غیرسیستمیک، از گروه سولفیت ها می باشد که با نحوه اثر تماسی بر حالات متحرک طیف وسیعی از کنه های گیاهی (Tetranychidae، Eriophyidae) در بسیاری از محصولات زراعی و باغی بسیار موثر است. پروپارژیت دارای اثر ضربه ای شدید، دوام طولانی، قوی و گسترده طیف است و کنه های مقاوم به سموم فسفره را نیز کنترل می کند.

نحوه اثر: پروپارژیت کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و دوام طولانی است و از طریق تنفس نیز روی کنه موثر است.

موارد مصرف (توصیه شده توسط سازمان حفظ نباتات):

محصول	آفت	مقدار مصرف
سبزیجات	کنه	۱ لیتر در هزار لیتر آب
پروپارژیت باید با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق بکار برده شود. پروپارژیت به غیر از کشت ذکر شده و آفت نامبرده توصیه نمی شود.	تار عنکبوتی	۱ لیتر در هزار لیتر آب

مدیریت کاربرد:

تذکره ۱: از مصرف پروپارژیت روی درختان گلابی و به جدا خودداری شود.

تذکره ۲: مصرف پروپارژیت در بعضی از درختان و گیاهان زراعی ممکن است باعث مسمومیت خفیف و در پاره ای موارد مسمومیت وسیع تر شود. بنابراین توصیه می شود در مواردی که سابقه مصرف پروپارژیت وجود ندارد، پیش از کاربرد در سطح وسیع، نسبت به آزمایش در سطح کوچک اقدام شود.

طریقه مصرف: ابتدا طبق جدول مصرف، مقدار توصیه شده از پروپارژیت را داخل یک سطل بصورت جداگانه در آب حل نمایید و سپس محلول آماده را داخل مخزن سمپاشی که تا نیمه از آب پر شده و نیز همزن آن روشن است، منتقل و سپس بقیه آب را اضافه نمایید و اقدام به محلول پاشی شود.

تاریخ انقضاء: در صورت نگهداری در شرایط مناسب انبار، عمر مفید پروپارژیت تا ۲ سال پس از تاریخ تولید است.

شماره تاییدیه برچسب سازمان حفظ نباتات: ۹۳۱۴/۷۳۰-۹۶/۰۴/۱۸

یک لیتر ۱%

برچسب سالم خارج از دسترس اطفال، اشخاص غیر فنی و حیوانات و جدا از مواد غذایی انسان و دام نگهدارید. درجه حرارت نگهداری پروپارژیت بین ۱۰+ تا ۳۵+ درجه سانتی گراد است.